

Кожные паразиты

Педикулез

На человеке паразитирует три вида вшей – платяная вошь, распространяющая сыпной тиф и ряд других болезней, не менее опасных, головная и лобковая вши, не передающие никаких болезней. Паразитируя на коже человека, вши питаются его кровью, их укусы не столько болезненны, сколько зудят, расчесы нередко инфицируются.

Головная вошь, хотя и не переносит болезней, вряд ли оставит родителей спокойными, поскольку она свидетельство гигиенического благополучия дома или в детском коллективе.

Головная вошь живет на волосистой части головы, питается кровью и откладывает яйца, прикрепляя их к волосам: это гниды, их легко увидеть невооруженным глазом. Через две-три недели из гнид выводятся взрослые насекомые. И весь процесс повторяется. Места укусов зудят, дети их расчесывают, нередко занося инфекцию. Возможны аллергические реакции.

Чаще других поражаются девочки с длинными волосами, особенно заплетенными в косы: их реже расчесывают. Но и при короткой стрижке встречается педикулез, когда не моют голову. Если ребенок заразился недавно, то у него обнаруживаются гниды; если от момента заражения прошло какое-то время, то на ряду с гнидами видны и взрослые насекомые.

Лечение.

Сейчас нет нужды прибегать к таким «героическим» методам борьбы с головной вошью, как мытье головы уксусом или керосином, стрижка наголо. Есть препарат **нитифор**, который губителен для насекомых и безвреден для человека. Им смазывают голову и волосы без втирания и оставляют на два-три часа, затем смывают мылом. Используют также **педилин**, **рид** и др. средства. Полезно перед этим удалить взрослых насекомых, вычесав волосы частым гребнем.

Профилактика.

Регулярный контроль за состоянием головы ребенка. Научите его не надевать чужих головных уборов. При выявлении необходимо провести осмотр всех контактных лиц.

Ст. медсестра

В.В. Чикишева